

ARE-Wochenbericht

Aktuelle Lage zu akut respiratorischen Erkrankungen
KW 08, Donnerstag, 26.02.2026.

Zusammenfassung der Lage in Deutschland

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung in Deutschland ist in der 08. KW 2026 im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die Grippewelle hält weiter an, der Höhepunkt der Grippewelle ist jedoch überschritten. Die RSV-Welle hält ebenfalls noch an. (*Robert Koch-Institut: ARE-Wochenbericht*)

Zusammenfassung der Lage in Baden-Württemberg

Die ARE-Aktivität in der Bevölkerung in Baden-Württemberg ist in der 08. KW 2026 im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben. Das ARE-Geschehen wird hauptsächlich durch Influenzaviren und RSV bestimmt.

ARE- Surveillance im ambulanten Bereich (Baden-Württemberg)

Der Wert der ARE-Konsultationen ist in der 08. KW im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen und liegt bei 1.605 Arztkonsultationen/100.000 Einwohnern (vgl. Abbildung 1). Bezogen auf die Bevölkerung in Baden-Württemberg entspricht dies einer Gesamtzahl von 176.550 Arztbesuchen wegen akuter Atemwegserkrankungen. Die höchste altersspezifische Konsultationsinzidenz ist weiterhin in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen zu beobachten.




Abbildung 1: Konsultationsinzidenz aufgrund akuter respiratorischer Erkrankungen in der aktuellen Saison (2025/2026, ab der 40 KW 2025) nach Altersgruppen und im Vergleich zu den Vorsaisons 2024/25, 2023/24 und 2022/23, Baden-Württemberg, Datenstand: 08/2026 (Quelle: RKI).

Laborbasierte Surveillance im Landesgesundheitsamt

Im Rahmen der laborbasierten Surveillance werden wöchentlich Proben von Patientinnen und Patienten mit ARE-Symptomatik aus circa 90 teilnehmenden Sentinel-Praxen in Baden-Württemberg auf ein respiratorisches Panel im Landesgesundheitsamt untersucht. In der 08. KW 2026 wurden im Landesgesundheitsamt bei insgesamt 52 (58.4%) der 89 eingesandten Proben respiratorische Erreger nachgewiesen. Die häufigsten Erreger sind mit insgesamt 20 (22%) positiven Proben Influenza, 16 (18%) positiven Proben RSV, und mit 3 (8%) positiven Proben Human Coronavirus (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Anzahl und Positivrate der im Rahmen der ARE Surveillance Baden-Württemberg identifizierten Atemwegserreger ab KW 40/2025, Datenstand: 26.02.2026.

	KW 01	KW 02	KW 03	KW 04	KW 05	KW 06	KW 07	KW 08	Gesamt*
Probenanzahl	53	105	191	235	163	149	166	89	2594
Anzahl mit Erregernachweis	34	53	105	143	104	95	96	52	1447
Positivrate (%)	64	50	55	61	64	64	58	58	56
Influenza A H1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influenza A H1N1	8	12	17	24	23	16	7	3	139
Influenza A H3	9	24	44	69	41	34	37	17	363
Influenza B	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Influenza Positivrate (%)**	32	37	32	41	38	36	27	22	20
Humanes Coronavirus 229E	0	1	7	4	3	5	4	1	36
Humanes Coronavirus HKU1	1	1	4	6	6	3	8	3	35
Humanes Coronavirus NL63	1	1	3	5	3	1	4	2	23
Humanes Coronavirus OC43	0	0	3	1	2	3	2	1	14
hCoV Positivrate (%)	4	3	8	7	8	8	9	8	4
Human Metapneumovirus	0	2	1	1	2	4	6	4	21
hMetapnv Positivrate (%)	0	2	1	0	1	3	4	4	1
Adenovirus	1	0	3	0	1	0	0	0	20
Adenovirus Positivrate (%)	2	0	2	0	1	0	0	0	1
Parainfluenza I	0	1	1	2	0	0	0	1	15
Parainfluenza II	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Parainfluenza III	1	1	4	0	1	1	4	2	26
Parainfluenza IV	0	1	2	0	0	1	0	0	25
Parainfluenza Positivrate (%)	2	3	4	1	1	1	2	3	3
RSV A	2	0	1	4	9	5	7	7	42
RSV B	4	1	4	3	8	12	9	9	66
RSV Positivrate (%)	11	1	3	3	10	11	10	18	4
Rhino-/Enterovirus	5	6	6	18	11	17	17	7	454
Rhino-/Enterovirus Positivrate (%)	9	6	3	8	7	11	10	8	18
Humanes Bocavirus	0	0	0	2	1	1	1	0	12
hBoca Positivrate (%)	0	0	0	1	1	1	1	0	0
SARS-CoV-2	8	4	7	2	6	2	0	0	225
SARS-CoV-2 Positivrate (%)	15	4	4	1	4	1	0	0	9
Chlamydomphila pneumoniae	1	0	1	1	0	0	0	0	12
C. pneumoniae Positivrate (%)	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Mycoplasma pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0	0	4
M. pneumoniae Positivrate (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*ARE-Saison nach Kalenderwoche. Gesamtanzahl bezieht sich auf alle Einsendungen seit KW 40/2025. Die Anzahl der eingesandten Proben kann von der Summe der negativen und positiven Proben abweichen, wenn Mehrfachinfektionen nachgewiesen wurden.

**Die Positivrate für Influenza umfasst sowohl subtypisierte (in der Tabelle dargestellt) als auch nicht subtypisierte Influenza-A-Nachweise (nicht in der Tabelle dargestellt).




Abbildung 2: Anteil der Erregernachweise im Rahmen des ARE-Praxis-Sentinel eingesandter Proben in der letzten 8 Wochen, Datenstand: 26.02.2026.




Abbildung 3: Anzahl der Nachweise nach Kalenderwoche der im Rahmen der ARE-Surveillance Baden-Württemberg im Landesgesundheitsamt identifizierten Atemwegserreger seit KW 40 der Saison 2024/25 bis zur aktuellen Berichtswoche der ARE-Saison 2025/2026, Datenstand: 26.02.2026.




Abbildung 4: Anteil der Nachweise nach Infektionserreger und Altersgruppe (Anzahl Proben nach Altersgruppen: 0-4 = 9; 5-9 = 5; 10-19 = 4; 20-39 = 16; 40-59 = 8; ≥60 = 9) der im Rahmen der ARE-Surveillance Baden-Württemberg im Landesgesundheitsamt identifizierten Atemwegserreger in der Saison 2025/26 an allen Nachweisen in der KW 08 (2026), Datenstand: 26.02.2026.

Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und Abwassermonitoring von SARs-CoV-2

Lage zu COVID-19

Meldedaten nach IfSG (Infektionsschutzgesetz)

In der 08. KW wurden insgesamt 91 COVID-19-Fälle aus Baden-Württemberg übermittelt. Im Vergleich zur Vorwoche mit 130 COVID-19-Fällen ist die Anzahl somit gesunken (s. Abb. 5). Die höchste altersgruppenspezifische Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe ab 80 Jahren beobachtet (s. Abb. 6). Die Anzahl von COVID-19-Patienten und Patientinnen auf Intensivstation (ITS) ist im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls gesunken (s. Abb. 7).




Abbildung 5: Anzahl der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldedatum, Baden-Württemberg, Stand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.




Abbildung 6: Übermittelte COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner, nach Altersgruppe und Meldewoche mit Landesdurchschnitt (rote Linie), Baden-Württemberg, Stand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.

Daten aus dem DIVI-Intensivregister




Abbildung 7: Anzahl der COVID-19 Patienten auf Intensivstation in Baden-Württemberg, Stand: 26.02.2026. Quelle: DIVI.

Influenza-Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Seit KW 40/2025 wurden insgesamt 24.021 Influenza-Fälle aus Baden-Württemberg übermittelt, hierunter 1.014 Fälle in der KW 08 (s. Abb. 8 & Tabelle 2). Die höchste altersgruppenspezifische Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe der 80-Jährigen und Älteren beobachtet (s. Abb. 9).

Tabelle 2: Anzahl Influenza-Fälle mit Angaben zum Influenza-Erreger nach Kalenderwoche und Influenzatypt/-subtyp KW 8/2026, Datenstand: 26.02.2026.

	KW 01	KW 02	KW 03	KW 04	KW 05	KW 06	KW 07	KW 08
Influenza A oder B Virus	32	15	34	16	20	17	21	9
Influenza A Virus (ohne Subtyp)	2.361	2.803	2.494	2.445	2.532	2.248	1.751	967
Influenza A(H1N1)pdm09 Virus	7	12	39	36	26	19	15	19
Influenza A(H3N2) Virus	13	4	10	16	10	22	1	3
Influenza B Virus	24	35	36	45	32	23	23	16
Influenza C Virus	0	0	1	1	0	2	0	0
Summe	2.437	2.869	2.614	2.559	2.620	2.331	1.811	1.014

Anzahl Influenza-Fälle, Saisons 2019/20 bis 2025/26, Baden-Württemberg

Datenstand: 2026-02-26




Abbildung 8: Influenza-Fälle nach Meldewoche und Influenzasaison, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.

Altersgruppenspezifische Inzidenzen, Influenza ab KW40 2025, Baden-Württemberg




Abbildung 9: Influenza-Fälle nach Meldewoche und Influenzasaison, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.

RSV-Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Seit KW 40/2024 wurden insgesamt 9.232 RSV-Fälle aus Baden-Württemberg übermittelt, hierunter 526 RSV-Fälle in der KW 08 (s. Abb. 10 & 11). Die höchste altersgruppenspezifische Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen Jahren beobachtet (s. Abb. 12).

Anzahl RSV-Fälle, Saisons 2022/23 bis 2025/26, Baden-Württemberg

Datenstand: 2026-02-26





Abbildung 10: RSV-Fälle nach Meldewoche und RSV-Saison, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.

Anzahl Übermittelter RSV-Fälle, ab KW40 2025, Baden-Württemberg



Datenstand: 2026-02-26

Abbildung 11: RSV-Fälle nach Meldewoche, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.




Abbildung 12: Altersgruppenspezifische Inzidenzen, RSV-Fälle ab KW 40/2024, nach Kalenderwoche, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.02.2026, 09:00 Uhr.

Daten aus dem Abwassermonitoring auf SARS-CoV-2, Influenza und RSV

Die Daten zu Abwasseruntersuchungen auf SARS-CoV-2, Influenza und RSV können auf der RKI Website unter: [RKI - Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht](#) abgerufen werden.

Kontakt

Referat 73 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz und Epidemiologie
 Nordbahnhofstrasse 135
 70191 Stuttgart
 Internet: sm.baden-wuerttemberg.de

Autoren und Redaktionsteam

Dressler A, Wagner-Wiening C, Dangel L, Rios Galicia B, Krause P, Oehme R, Brockmann SO.

Vorgeschlagene Zitierweise

Landesgesundheitsamt, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg.
 ARE-Wochenbericht KW 08, 2026.