Baden-Württemberg
Ministerium für Soziales,
Arbeit und Gesundheit

Landesgesundheitsamt
Baden-Württemberg

# ARE-Wochenbericht

**Aktuelle Lage zu akut respiratorischen Erkrankungen**
**KW 47, Donnerstag, 26.11.2026.**

## Zusammenfassung der Lage in Deutschland

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung in Deutschland befindet sich weiterhin auf einem moderaten Niveau. Das ARE-Geschehen wird weiterhin hauptsächlich durch Rhino-/Enteroviren bestimmt. *(Robert Koch-Institut: ARE-Wochenbericht)*

## Zusammenfassung der Lage in Baden-Württemberg

Die ARE-Aktivität in der Bevölkerung in Baden-Württemberg ist in der KW 47/2026 im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben. Das ARE-Geschehen wird hauptsächlich durch Rhino-/Enteroviren und Parainfluenza bestimmt.

## ARE- Surveillance im ambulanten Bereich (Baden-Württemberg)

Der Wert der ARE-Konsultationen ist in der KW 47/2026 im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen und liegt bei 1.341 Arztkonsultationen/100.000 Einwohnern (vgl. Abbildung 1). Bezogen auf die Bevölkerung in Baden-Württemberg entspricht dies einer Gesamtzahl von 147.510 Arztbesuchen wegen akuter Atemwegserkrankungen. Die höchste altersspezifische Konsultationsinzidenz ist weiterhin in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen zu beobachten.





**Abbildung 1: Konsultationsinzidenz aufgrund akuter respiratorischer Erkrankungen in der aktuellen Saison (2026/2027, ab der 40 KW/2026) nach Altersgruppen und im Vergleich zu den Vorsaisons 2025/26, 2024/25, 2023/24 und 2022/23, Baden-Württemberg, Datenstand: 47/2026 (Quelle: RKI).**

**Laborbasierte Surveillance im Landesgesundheitsamt**

Im Rahmen der laborbasierten Surveillance werden wöchentlich Proben von Patientinnen und Patienten mit ARE-Symptomatik aus circa 90 teilnehmenden Sentinel-Praxen in Baden-Württemberg auf ein respiratorisches Panel im Landesgesundheitsamt untersucht. In der KW 47/2026, wurden im Landesgesundheitsamt bei insgesamt 44 (45.4%) der 97 eingesandten Proben respiratorische Erreger nachgewiesen. Die häufigsten Erreger sind mit insgesamt 19 (20%) positiven Proben Rhino-/Enterovirus, und mit 10 (10%) positiven Proben Parainfluenza (vgl. Tabelle 1).

**Tabelle 1: Anzahl und Positivrate der im Rahmen der ARE Surveillance Baden-Württemberg identifizierten Atemwegserreger ab KW 40/2026, Datenstand: 26.11.2026.**

| | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | Gesamt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenanzahl | 74 | 82 | 106 | 88 | 75 | 92 | 107 | 97 | 684 |
| Anzahl mit Erregernachweis | 42 | 54 | 70 | 54 | 41 | 46 | 56 | 44 | 389 |
| **Positivenrate (%)** | **57** | **66** | **66** | **61** | **55** | **50** | **52** | **45** | **57** |
| Influenza A H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Influenza A H1N1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| Influenza A H3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Influenza B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Influenza Positivenrate (%)**** | **1** | **2** | **3** | **3** | **3** | **2** | **4** | **4** | **3** |
| Humanes Coronavirus 229E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humanes Coronavirus HKU1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Humanes Coronavirus NL63 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Humanes Coronavirus OC43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| **hCoV Positivenrate (%)** | **3** | **4** | **5** | **3** | **3** | **7** | **7** | **7** | **5** |
| Human Metapneumovirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **hMetapnv Positivenrate (%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Adenovirus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| **Adenovirus Positivenrate (%)** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **1** | **1** |
| Parainfluenza I | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Parainfluenza II | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 |
| Parainfluenza III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Parainfluenza IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **Parainfluenza Positivenrate (%)** | **7** | **6** | **3** | **7** | **13** | **10** | **8** | **10** | **8** |
| RSV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **RSV Positivenrate (%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Rhino-/Enterovirus | 34 | 41 | 54 | 39 | 25 | 27 | 33 | 19 | 257 |
| **Rhino-/Enterovirus Positivenrate (%)** | **46** | **50** | **51** | **44** | **33** | **29** | **31** | **20** | **38** |
| Humanes Bocavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **hBoca Positivenrate (%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| SARS-CoV-2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 31 |
| **SARS-CoV-2 Positivenrate (%)** | **3** | **6** | **5** | **5** | **4** | **3** | **6** | **3** | **5** |
| Chlamydophila pneumoniae | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| **C. pneumoniae Positivenrate (%)** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** |
| Mycoplasma pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **M. pneumoniae Positivenrate (%)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*ARE-Saison nach Kalenderwoche. Gesamtanzahl bezieht sich auf alle Einsendungen seit KW 40/2026. Die Anzahl der eingesandten Proben kann von der Summe der negativen und positiven Proben abweichen, wenn Mehrfachinfektionen nachgewiesen wurden.
**Die Positivrate für Influenza umfasst sowohl subtypisierte (in der Tabelle dargestellt) als auch nicht subtypisierte Influenza-A-Nachweise (nicht in der Tabelle dargestellt).





**Abbildung 2: Anteil der Erregernachweise im Rahmen des ARE-Praxis-Sentinels eingesandter Proben in der letzten 8 Wochen, Datenstand: 26.11.2026.**





**Abbildung 3: Anzahl der Nachweise nach Kalenderwoche der im Rahmen der ARE-Surveillance Baden-Württemberg im Landesgesundheitsamt identifizierten Atemwegserreger seit KW 40 der Saison 2025/26 bis zur aktuellen Berichtswoche der ARE-Saison 2026/2027, Datenstand: 26.11.2026.**





**Abbildung 4: Anteil der Nachweise nach Infektionserreger und Altersgruppe (Anzahl Proben nach Altersgruppen: 0-4 = 9; 5-9 = 6; 10-19 = 4; 20-39 = 12; 40-59 = 6; ≥60 = 6) der im Rahmen der ARE-Surveillance Baden-Württemberg im Landesgesundheitsamt identifizierten Atemwegserreger in der Saison 2025/26 an allen Nachweisen in der KW 47/2026, Datenstand: 26.11.2026.**

## Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und Abwassermonitoring von SARs-CoV-2

### Lage zu COVID-19

### Meldedaten nach IfSG (Infektionsschutzgesetz)

In der KW 47/2026 wurden insgesamt 294 COVID-19-Fälle aus Baden-Württemberg übermittelt. Im Vergleich zur Vorwoche mit 229 COVID-19-Fällen ist die Anzahl somit gestiegen (s. Abb. 5). Die höchste altersgruppenspezifische Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe ab 80 Jahren beobachtet (s. Abb. 6). Die Anzahl von COVID-19-Patienten und Patientinnen auf Intensivstation (ITS) ist im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls gestiegen (s. Abb. 7).





**Abbildung 5: Anzahl der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldedatum, Baden-Württemberg, Stand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**





**Abbildung 6: Übermittelte COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner, nach Altersgruppe und Meldewoche mit Landesdurchschnitt (rote Linie), Baden-Württemberg, Stand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**

**Daten aus dem DIVI-Intensivregister**





**Abbildung 7: Anzahl der COVID-19 Patienten auf Intensivstation in Baden-Württemberg, Stand: 26.11.2026. Quelle: DIVI.**

## Influenza-Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Seit KW 40/2025 wurden insgesamt 26.239 Influenza-Fälle aus Baden-Württemberg übermittelt, hierunter 126 Fälle in der KW 47/2026 (s. Abb. 8 & Tabelle 2). Die höchste altersgruppenspezifische Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe ab 80 Jahren beobachtet (s. Abb. 9).

**Tabelle 2: Anzahl Influenza-Fälle mit Angaben zum Influenza-Erreger nach Kalenderwoche und Influenzatyp/-subtyp KW 47/2026, Datenstand: 26.11.2026.**

| | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influenza A oder B Virus | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Influenza A Virus (ohne Subtyp) | 62 | 43 | 39 | 44 | 46 | 47 | 116 | 107 |
| Influenza A(H1N1)pdm09 Virus | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Influenza A(H3N2) Virus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Influenza B Virus | 7 | 9 | 7 | 14 | 10 | 16 | 14 | 16 |
| Influenza C Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **70** | **54** | **47** | **62** | **60** | **66** | **138** | **126** |





**Abbildung 8: Influenza-Fälle nach Meldewoche und Influenzasaison, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**





**Abbildung 9: Influenza-Fälle nach Meldewoche und Influenzasaison, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**

## RSV-Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Seit KW 40/2025 wurden insgesamt 6.616 RSV-Fälle aus Baden-Württemberg übermittelt, hierunter 8 RSV-Fälle in der KW 47/2026 (s. Abb. 10 & 11). Die höchste altersgruppenspezifische Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe ab 80 Jahren beobachtet (s. Abb. 12).





**Abbildung 10: RSV-Fälle nach Meldewoche und RSV-Saison, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**





**Abbildung 11: RSV-Fälle nach Meldewoche, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**





**Abbildung 12: Altersgruppenspezifische Inzidenzen, RSV-Fälle ab KW 40/2025, nach Kalenderwoche, Baden-Württemberg, Datenstand: 26.11.2026, 09:00 Uhr.**

**Daten aus dem Abwassermonitoring auf SARS-CoV-2, Influenza und RSV**

Die Daten zu Abwasseruntersuchungen auf SARS-CoV-2, Influenza und RSV können auf der RKI Website unter: RKI - Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht abgerufen werden.

**Kontakt**
Referat 73 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz und Epidemiologie
Nordbahnhofstrasse 135
70191 Stuttgart
Internet: sm.baden-wuerttemberg.de

**Autoren und Redaktionsteam**
Dressler A, Wagner-Wiening C, Rios Galicia B, Krauze P, Oehme R, Brockmann SO.

**Vorgeschlagene Zitierweise**
Landesgesundheitsamt, Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg. ARE-Wochenbericht KW 47, 2026.